

## QUE FAIRE À L'APPARITION D'UN SYMPTÔME DE LA COVID-19 CHEZ VOTRE ENFANT

Il est très important de surveiller tous les symptômes compatibles à la COVID-19 chez votre enfant. Ils peuvent être légers ou plus importants.

Nous joignons ci-dessous la liste des symptômes en date d'aujourd'hui et le lien du site du gouvernement pour s'y référer parce que les consignes peuvent changer sans préavis :

<https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement>

En ce qui concerne l'isolement, nous vous invitons à consulter les guides de tests rapides et de la durée de l'isolement toujours du gouvernement.

[Télécharger le guide de tests rapides](#)

[Télécharger le feuillet sur la durée d'isolement](#)

## SYMPTÔME DE LA COVID-19

Enfants de 6 mois à 5 ans	Enfants de 6 à 17 ans et adultes
<p>Avoir la présence d'au moins l'un des symptômes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale),</li><li>• toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer;</li></ul> <p><b>OU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mal de gorge <b>ET</b> fièvre de 38,1°C (100,6 °F) et plus (température rectale),</li><li>• maux de ventre, vomissements ou diarrhée <b>ET</b> fièvre de 38,1°C (100,6 °F) et plus (température rectale),</li><li>• nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue <b>ET</b> un autre symptôme ci-dessus.</li></ul>	<p>Avoir la <b>présence d'un des symptômes</b> suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fièvre de 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale),</li><li>• perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût,</li><li>• toux (nouvelle ou aggravée),</li><li>• essoufflement,</li><li>• difficulté à respirer,</li><li>• mal de gorge,</li></ul> <p>ou avoir la <b>présence d'au moins deux des symptômes</b> suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue,</li><li>• maux de tête,</li><li>• grande fatigue,</li><li>• douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique),</li><li>• perte d'appétit importante,</li><li>• nausées ou vomissements,</li><li>• maux de ventre,</li><li>• diarrhée.</li></ul>

## **À LA MAISON PENDANT L'ISOLEMENT DE L'ÉLÈVE**

Pour les élèves en isolement et absents de l'école plus de 2 jours, des services éducatifs seront offerts sur une base quotidienne, lui permettant de poursuivre ses apprentissages. Un contact direct et quotidien sera fait afin d'assurer un suivi pédagogique. Du matériel pédagogique, didactique et informatique lui sera fourni, selon les besoins, lui permettant de réaliser des activités d'apprentissage à la maison. Diverses pratiques seront utilisées afin d'assurer la poursuite des apprentissages (travaux à effectuer à la maison, rendez-vous téléphoniques avec l'enseignant ou en TEAMS, enregistrement de capsules à écouter dans le but de réaliser le projet ou l'activité, etc.).

## **DISTRIBUTION DES TROUSSES DE TEST RAPIDE À LA MAISON PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE**

La distribution des trousse de tests rapides de dépistage à la maison a débuté hier et se poursuivra au cours de cette semaine. Surveillez le sac d'école de votre enfant.

## **TEST DE DÉPISTAGE FAIT À L'ÉCOLE**

Ces tests rapides se poursuivront dans le cas où les élèves développent des symptômes au cours de la journée. Rappelons que le consentement parental demeurera requis pour les élèves du primaire et pour ceux du secondaire de 13 ans et moins.

Ces tests seront dorénavant disponibles pour les élèves du secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle.

Soulignons que peu importe le résultat du test, l'élève devra quitter l'école et retourner à la maison. Si le test est positif, suivre les consignes d'isolement à la maison. S'il est négatif, l'élève doit s'isoler et passer un 2<sup>e</sup> test 24 heures plus tard.

## **ISOLEMENT DE TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE**

Veillez noter que si votre enfant a un symptôme de la COVID-19 ou a testé positif à un test rapide, il doit s'isoler ainsi que les personnes qui vivent sous le même toit que lui.

## **LE PORT DU MASQUE AU SERVICE DE GARDE À LA SUITE D'UN ISOLEMENT**

Le port du masque est obligatoire au service de garde pour tous les élèves qui sont de retour suite à un isolement de 5 jours. Cette consigne ne s'applique pas pour les élèves du préscolaire.